

► (A) ITALIA. Percezione malattie più frequenti tra immigrati: differenze per professioni e territorio 1995-2002

| Risposte possibili | PROFESSIONI | | | | LUOGO DEL TEST | | | ANNO DELL'EVENTO | | |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| | medico | infermiere | altro | totale | Cen.-sud | nord | totale | 1995-98 | 2000-02 | totale |
| Tubercolosi | 81 34,62% | 285 48,39% | 100 41,67% | 466 43,84% | 84 30,77% | 390 46,32% | 474 42,51% | 85 36,48% | 372 44,50% | 457 42,75% |
| Bronchite | 46 19,66% | 74 12,56% | 33 13,75% | 153 14,39% | 41 15,02% | 118 14,01% | 159 14,26% | 39 16,74% | 114 13,64% | 153 14,31% |
| Depressione | 33 14,10% | 57 9,68% | 35 14,58% | 125 11,76% | 56 20,51% | 90 10,69% | 146 13,09% | 38 16,31% | 96 11,48% | 134 12,54% |
| Gastrite | 38 16,24% | 37 6,28% | 16 6,67% | 91 8,56% | 33 12,09% | 61 7,24% | 94 8,43% | 27 11,59% | 64 7,66% | 91 8,51% |
| Malattie veneree | 10 4,27% | 45 7,64% | 21 8,75% | 76 7,15% | 19 6,96% | 58 6,89% | 77 6,91% | 13 5,58% | 61 7,30% | 74 6,92% |
| Aids | 5 2,14% | 47 7,98% | 22 9,17% | 74 6,96% | 14 5,13% | 63 7,48% | 77 6,91% | 8 3,43% | 68 8,13% | 76 7,11% |
| Tonsillite | 13 5,56% | 18 3,06% | 4 1,67% | 35 3,29% | 15 5,49% | 20 2,38% | 35 3,14% | 11 4,72% | 22 2,63% | 33 3,09% |
| Malaria | 6 2,56% | 17 2,89% | 4 1,67% | 27 2,54% | 5 1,83% | 28 3,33% | 33 2,96% | 7 3,00% | 25 2,99% | 32 2,99% |
| Psicosi | 2 0,85% | 3 0,51% | 5 2,08% | 10 0,94% | 5 1,83% | 7 0,83% | 12 1,08% | 3 1,29% | 8 0,96% | 11 1,03% |
| Altro | 0 0,00% | 6 1,02% | 0 0,00% | 6 0,56% | 1 0,37% | 7 0,83% | 8 0,72% | 2 0,86% | 6 0,72% | 8 0,74% |
| Totale | 234 100 % | 589 100 % | 240 100 % | 1.063 100 % | 273 100 % | 842 100 % | 1.115 100 % | 233 100 % | 836 100 % | 1.069 100 % |

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Indagine Area sanitaria Caritas Diocesana di Roma 2005.

► (B) ITALIA. Percezione sulle malattie più frequenti tra gli immigrati

| Risposte possibili | PRIMA RISPOSTA | | SOMMA PRIME 3 RISP.* | | PRIMA RISP. | | SOMMA PRIME 3 RISP.* | | |
|--------------------|----------------|------|----------------------|------|-----------------|--------------|----------------------|-----------|------|
| | frequenza | % | frequenza | % | Risp. possibili | frequenza | % | frequenza | % |
| Tubercolosi | 480 | 42,6 | 707 | 62,7 | Aids | 77 | 6,8 | 394 | 35,0 |
| Bronchite | 160 | 14,2 | 433 | 38,4 | Tonsillite | 36 | 3,2 | 165 | 14,6 |
| Depressione | 148 | 13,1 | 417 | 37,0 | Malaria | 34 | 3,1 | 217 | 19,2 |
| Gastrite | 94 | 8,3 | 217 | 19,3 | Psicosi | 12 | 1,1 | 120 | 10,6 |
| Malattie veneree | 78 | 6,9 | 383 | 34,0 | Altro | 8 | 0,7 | 21 | 1,9 |
| | | | | | Totale | 1.127 | 100,0 | | |

* Sono state sommate le prime tre risposte con le relative percentuali

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Indagine Area sanitaria Caritas Diocesana di Roma 2005.

► (C) ITALIA. Casistiche ambulatoriali a confronto per gruppi di malattie. Valori percentuali

| | Apparato respiratorio | App. gastroent. | Ortoped. traumatol. | Tessuto cutaneo | Malattie infettive | Ostetrico- ginecologico | Genito- urinario | Disturbi psichici |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| CSI Brescia (1990-2004) | 10,80 | 10,60 | 20,20 | 6,70 | 6,80 | 2,20 | 7,10 | 1,10 |
| Caritas Roma (1983-2004) | 15,50 | 12,80 | 14,60 | 8,90 | 7,50 | 8,80 | 6,10 | 3,40 |
| S. Chiara Palermo (1987-2004) | 17,30 | 12,20 | 13,10 | 10,80 | 4,30 | 1,30 | 5,60 | 1,30 |

FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati SIMM 2005.